

## NUEVOS DATOS SOBRE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE CUENCA, XXVII

Gonzalo MATEO SANZ<sup>1</sup>, Vicente J. ARÁN REDÓ<sup>2</sup>  
& Agustín CORONADO MARTÍNEZ<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jardín Botánico. Universidad de Valencia.

C/ Quart, 80. 46008-Valencia. gonzalo.mateo@uv.es

<sup>2</sup>C/ Durazno 5, esc. 1, 2º C. 28044-Madrid. uvejotaran@gmail.com

<sup>3</sup>C/ Pino negral, 10, 1º A. 16003. Cuenca. aguscorenator@gmail.com

**RESUMEN:** Se comunica el hallazgo de nuevas especies de plantas vasculares en la provincia de Cuenca, que resultan de interés en dicho territorio. **Palabras clave:** Flora, Cuenca, España, plantas vasculares.

**ABSTRACT:** Floristic novelties for the province of Cuenca (CE Spain), XXVII. Some taxa of vascular plantas collected in the province of Cuenca (CE Spain) are here commented. **Key words:** Flora, Cuenca, Spain, vascular plants.

### INTRODUCCIÓN

Este artículo representa la continuación de la larga serie que venimos publicando desde hace ya veinte años (ver MATEO, HERNÁNDEZ & al., 1995; MATEO, FABREGAT & LÓPEZ UDIAS, 1996; MATEO & ARÁN, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 2001, 2002; MATEO & HERNÁNDEZ, 1998a, 1998b, 1999; MATEO, FABREGAT & al., 1999; MATEO, PISCO & al., 1999; ARÁN & MATEO, 1999, 2001, 2003; MATEO, ARÁN & al., 2001; MATEO, MAYORAL & GÓMEZ-SERRANO, 2001, 2004; MATEO & MORENO, 2003, 2004), MATEO & CORONADO, 2006, 2007, 2010; MATEO, ARÁN & CORONADO, 2008 y MATEO, 2013), en la que se comentan, por su novedad o rareza, o por cualquier otro motivo de interés, algunas plantas vasculares recogidas en la provincia de Cuenca.

### LISTADO DE PLANTAS

*Achillea* × *bronchalensis* Mateo, Fabado & C. Torres (*odorata* × *tomentosa*)

**CUENCA:** 30TWK8544, Buenache de la Sierra, barranco de Agüerillo, 1280 m, pastizales vivaces sobre arenas silíceas (interparentes), 7-VI-2015, G.M., V.J.A. & A.C. (v.v.).

En la propuesta original del taxon (cf. MATEO, FABADO & TORRES, 2008), con tipo en la Sierra de Albarracín (Teruel), también se mencionaban un par de localidades de esta provincia y posteriormente MAYORAL (2011: 108) se hace eco de una anterior indicación de G. López (alusión parental) en la Sierra de Valdemeca.

**Artemisia verlotorum** Lamotte

\***CUENCA:** 30TWK7537, Cuenca, Hoz del Huécar, herbazales alterados en la orilla del río, 950 m, 7-VI-2015, G.M., V.J.A. & A.C. (v.v.).

Planta invasora y relativamente termófila, pero que va avanzado con los años hacia zonas cada vez más frescas e interiores. No conocemos cita en Cuenca ni aparece mencionada en esta provincia en la página de ANTHOS (2015).

**Campanula semisecta** Murb.

**CUENCA:** 30TWK7839, Cuenca, El Vallejo, pastizales secos anuales en ambiente calizo escarpado, 1180 m, 7-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.).

Planta que pasa desapercibida por lo efímera, pero que debe estar más extendida por la provincia de lo que parece. En el mapa que ofrece ANTHOS (2015) solamente aparece reflejada de un punto, en su mismo extremo meridional.

**Centaurea depressa** Bieb.

**CUENCA:** 30SWJ7685, Olmedilla de Alarcón, afueras de la población, herbazales nitrófilos, 820 m, 5-VI-2015, *G.M.* (v.v.).

En ANTHOS (2015) se reflejan solamente unos pocos puntos de la zona periférica provincial (publicados previamente en MATEO & ARÁN, 1996a, 2000 y MUÑOZ & DEVESA, 2010). Seguramente acabará apareciendo por gran parte de la provincia, aunque a través de ejemplares sueltos y pequeñas poblaciones fluctuantes.

**Chrozophora tinctoria** (L.) Raf.

**CUENCA:** 30TWK6564, Sotorribas (Ribagorda), ctra. CUV-9116, pr. Cerro Santiago, 990 m, borde de cultivo y cunetas, 23-VII-2014, *A.C.* (v.v.). 30TWK7548, Mariana, ctra. CM-2105, pr. El Sargal, cunetas y cultivos de secano, 950 m, 24-VII-2014, *A.C.* (v.v.). 30TWK7651, ibidem, ctra. CM-2105, pr. Vega del Sitio, 960 m, barbechos, 24-VII-2014, *A.C.* (v. v.). 30TWK7766, Arcos de la Sierra, pr. El Covarrón, 1000 m, barbechos, 18-VII-2014, *A. C.* (v.v.).

Planta de carácter marcadamente termófilo, que coloniza cultivos y terrenos removidos. Sólo hemos encontrado otra referencia previa para esta provincia, en el término municipal de Valeria (MATEO & MORENO, 1997: 53).

**Cymbalaria muralis** Bieb.

**CUENCA:** 30TWK7537, Cuenca, Hoz del Huécar, sobre un muro agrícola, 960 m, 7-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.). 30TWK6564, Sotorribas, casco urbano de Ribagorda, acera en umbría con humedad edáfica, 990 m, 20-V-2012, *A.C.* (v.v.). 30TWK7269: Castillejo de la Sierra, casco urbano, taludes, cunetas y aceras, 1015 m, 28-V-2012, *A.C.* (v.v.). 30T

WK7271, Fresneda de la Sierra, casco urbano, aceras, 990 m, 28-V-2012, *A.C.* (v.v.).

En el mapa peninsular que se ofrece en ANTHOS (2015) vemos algún punto en la línea límite provincial pero en el listado de localidades no aparece en Cuenca. Es probable que se esté extendiendo en estos últimos años, pero parece haber colonizado los ambientes urbanos de buena parte del territorio.

**Helianthemum × hispidum** (Lam.) Dunal  
(*apenninum × hirtum*)

**CUENCA:** 30TWK8232, Cuenca, Hoz de San Miguel, 1080 m, matorrales secos sobre calizas (inter parentes), 7-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.).

Indicado por O. MAYORAL (2011: 106) en Casas de Garcimolina, pero seguramente estará bastante extendido, al menos por el norte provincial.

**Helianthemum × sulphureum** Willd.  
(*apenninum × nummularium*)

**CUENCA:** 30TWK8144, Buenache de la Sierra, arroyo de Bonilla, 1150 m, pastizales vivaces sobre calizas (inter parentes), 7-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.).

Solamente nos consta la mención provincial previa de MAYORAL (2011: 106) para este híbrido, aunque no debe ser demasiado raro en las áreas serranas del norte de la provincia.

**Iberis ciliata** L.

**CUENCA:** 30SXJ2692, Mira, El Escalón, terrenos margosos despejados, 970 m, 27-V-2015, *G.M.* (v.v.).

Planta no abundante, pero dispersa por gran parte del ámbito iberolevantino, de la que solamente vemos atribuido un par de puntos para Cuenca (extremos norte y sureste) en ANTHOS (2015), a los que añadir el que mencionábamos hace unos años en Minglanilla (MATEO, 1996: 40; ut *I. ciliata* subsp. *vinetorum*).

**Medicago truncatula** Gaertn.

\***CUENCA:** 30SWJ8680, Valhermoso de la Fuente, pr. La Raposera, 820 m, herbazales secos anuales, 5-VI-2015, *G.M.* (v.v.).

No aparece indicado para Cuenca ni en *Flora iberica* (CASTROVIEJO & al., 2000) ni en ANTHOS (2015), pero en ambos casos vemos que su presencia es inevitable dado que existe en la mayor parte de las provincias de la España peninsular, afectando a zonas muy limítrofes.

### **Salvia sclarea** L.

**CUENCA:** 30TWK6472, La Frontera, ctra, CM-210, pr. El Lostal, 970 m, cuneta, 7-VII-2015, *A.C.* (v.v.). 30TWK7576, Arcos de la Sierra, afueras del pueblo, 990 m, cuneta húmeda junto a *Sambucus ebulus*, 18-VII-2014, *A.C.* (v.v.).

Planta cultivada antiguamente como ornamental y medicinal, que actualmente coloniza cunetas sobre suelos removidos. No aparece ninguna referencia de esta especie para la provincia de Cuenca en *Flora iberica* (cf. CASTROVIEJO & al., 2010) ni en la página de ANTHOS (2015).

### **Sideritis** × **pau**i Font Quer (*hirsuta* × *incana*)

**CUENCA:** 30TWK8039, Cuenca, El Vallejo, 1180 m, matorrales secos sobre calizas (junto a *S. hirsuta*), 7-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (vv).

Se presenta rara pero dispersa por la provincia, de donde ya la habíamos mencionado previamente hace unos años de un par de localidades (MATEO & ARÁN, 1998: 34 y 2000: 15) más al sur y MAYORAL (2011: 216) al este.

### **Silene muscipula** L.

**CUENCA:** 30TWK6565, Sotorribas (Ribagorda), pr. Los Blancares, 960 mn matorral sobre yesar, 30-V-2007, *A.C.* (v.v.). 30TWK7157, Collados, pr. El Salitral, 1030 m, pendiente yesosa, 5-VI-2003, *A.C.* (v.v.). 30TWK7537, Cuenca, El Vallejo, pastizales secos anuales transitados, 1180 m, 7-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.). 30TWK8160, Portilla, pr. Hoz del Moro, 1250 m, pedregal sobre suelo margoso-calizo, 14-VI-2011, *A.C.* (v.v.).

De presencia bastante anecdótica o accidental en esta provincia, aunque seguramente bastante más extendida de lo que da a entender el mapa de ANTHOS (2015)

que solamente indica un punto (área occidental). Por ejemplo en la tesis doctoral de O. MAYORAL (2011: 94) se indica también de Pajaroncillo.

### **Thymus** × **eliasii** Sennen & Pau (*mastichina* × *vulgaris*)

**CUENCA:** 30SWJ7487, Olmedilla de Alarcón, pr. Puente de la Cañada, 810 m, arenales silíceos de aluvi6n fluvial (*inter parentes*), 5-VI-2015, *G.M.* (v.v.). 30TWK8642, Buenache de la Sierra, Los Rodenales, arenales silíceos despejados (*inter parentes*), 1260 m, 6-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.).

Un híbrido discreto, que no se deja ver demasiado y que ya habíamos indicado previamente de un par de localidades, situadas más al oeste (cf. MATEO & CRESPO, 1993: 134).

### **Thymus** × **rivas-molinae** Mateo & M. B. Crespo (*borgiae* × *mastichina*)

**CUENCA:** 30TWK8642, Buenache de la Sierra, Los Rodenales, arenales silíceos despejados (*inter parentes*), 1260 m, 6-VI-2015, *G.M., V.J.A. & A.C.* (v.v.).

Un híbrido exclusivo de la Península y francamente raro, que ya habíamos mencionado en la provincia, aunque en ambos casos en el término de Uña (cf. MATEO & CRESPO, 1993: 130; MATEO & HERNÁNDEZ, 1999: 32) y O. MAYORAL (2011: 222) de Algarra.

### **Tragus racemosus** (L.) All.

**CUENCA:** 30TWK6829, Villar de Olalla, márgenes de la N-320, 920 m, cunetas a la salida del pueblo hacia San Lorenzo de la Parrilla, 30-VII-2012, *A.C.* (v.v.). 30TWK7344, Cuenca, Puente del Chantre, ctra. CM-2105, cunetas, 19-IX-2015, *A.C.* (v.v.).

Planta term6fila de la que sólo hemos hallado una cita para esta provincia en el valle del Cabriel limítrofe con Valencia (MATEO, FABREGAT, L6PEZ UDÍAS & MARÍN CAMPOS, 1999: 42). Acompaña a otras plantas ruderales y viarias, de 6ptimo ecol6gico más t6rmico, en su expansi6n cada vez más rápida hacia zonas relativamente elevadas en el piso supramediterráneo.

**Urospermum picroides** (L.) Scop.

**CUENCA:** 30SXJ2392, Mira, Vallejo de los Escalones, 660 m, herbazales nitrófilos y cunetas, 27-V-2015, *G.M.* (v.v.).

La cita que dábamos recientemente (MATEO, 2013) en el término de Talayuelas parece que seguía siendo la única conocida para la provincia.

**Vicia ervilia** L.

\***CUENCA:** 30SWJ7685, Olmedilla de Alarcón, afueras de la población, herbazales nitrófilos, 820 m, 5-VI-2015, *G.M.* (v.v.). 30TWK7049, Sotorribas (Sotos), pr. arroyo de los Arbolillos, 990 m, borde de cultivo de girasol, 16-VI-2011, *A.C.* (v.v.).

No debería ser demasiado rara, pero no vemos en la bibliografía ni en la síntesis de ANTHOS (2015), ninguna referencia previa provincial para esta especie.

**BIBLIOGRAFÍA**

- ANTHOS (2015) *Sistema de información sobre las plantas de España*. En: <http://www.anthos.es>.
- ARÁN, V. J. & G. MATEO (1999, 2001, 2003) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, X, XIV y XVIII. *Fl. Montib.* 12: 33-39, 17: 24-30 y 23: 3-8.
- CASTROVIEJO & al. (ed.) (2000, 2010) *Flora ibérica*. Vols. 7b y 12. Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid.
- MATEO, G. (1996) Sobre la flora y vegetación de las Hoces del Cabriel (Cuenca-Valencia). *Fl. Montib.* 3: 34-43.
- MATEO, G. (2013) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XXVI. *Fl. Montib.* 55: 114-117.
- MATEO, G. & V. J. ARÁN (1996a, 1996b, 1998, 2000, 2001, 2002) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, III, IV, VI, XII, XV y XVII. *Fl. Montib.* 3: 92-96, 4: 32-37, 9: 28-36, 16: 10-18, 18: 45-50 y 20: 1-5.
- MATEO, G., V. J. ARÁN & A. CORONADO (2008) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XXIV. *Fl. Montib.* 40: 38-46.
- MATEO, G., V. J. ARÁN, M. A. GÓMEZ-SERRANO & O. MAYORAL (2001) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XIII. *Fl. Montib.* 17: 3-10.
- MATEO, G. & A. CORONADO (2006, 2007, 2010) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XXII, XXIII y XXV. *Fl. Montib.* 32: 28-31, 36: 26-32; 44: 92-94.
- MATEO, G. & M.B. CRESPO (1993) Consideraciones sobre algunos tomillos ibéricos y sus híbridos. *Rivasgodaya* 7: 127-135.
- MATEO, G., J. FABADO & C. TORRES (2008) Sobre un nuevo híbrido del género *Achillea* (Compositae) en el Sistema Ibérico. *Fl. Montib.* 38: 3-6.
- MATEO, G., C. FABREGAT & S. LÓPEZ (1996) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, II. *Fl. Montib.* 2: 72-74.
- MATEO, G., C. FABREGAT, S. LÓPEZ & F. MARÍN (1999) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, IX. *Fl. Montib.* 11: 38-43.
- MATEO, G. & M. L. HERNÁNDEZ (1998a, 1998b, 1999) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, V, VII y XI. *Fl. Montib.* 8: 33-41, 10: 49-53, 13: 26-33.
- MATEO, G., M. L. HERNÁNDEZ, S. TORRES & A. VILA (1995) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, I. *Fl. Montib.* 1: 33-37.
- MATEO, G., O. MAYORAL & M. A. GÓMEZ SERRANO (2001, 2004) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XVI y XXI. *Fl. Montib.* 19: 45-52; 27: 42-46.
- MATEO, G. & J.M. MORENO (2003, 2004) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XIX y XX. *Fl. Montib.* 23: 25-28, 26: 3-6.
- MATEO, G., J. M. PISCO, A. MARTÍNEZ & F. MARÍN (1999) Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, VIII. *Fl. Montib.* 11: 9-11.
- MAYORAL GARCÍA-BERLANGA, O. (2011) *Estudio florístico y aportaciones a la conservación del alto Cabriel (Cuenca)*. Tesis doctoral. Universidad de Valencia.
- MUÑOZ, A.F. & J.A. DEVESA (2010) Revisión taxonómica del complejo de *Centaurea cyanus* en la Península Ibérica. *Acta Bot. Malac.* 35: 23-55.

(Recibido el 1-IX-2015  
Aceptado el 27-IX-2015)