

NEOTIPIFICACIÓN DE *TEUCRIUM* × *SALGADOI* SENNEN (*LAMIACEAE*)Agustín LAHORA¹, José Luis CÁNOVAS² & Pedro SOLANO³¹ Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería, carretera Sacramento.
04120-Almería. agustinla@gmail.com² Departamento de Biología Vegetal. Área de Botánica. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo,
30100-Murcia. joseluis.canovas@um.es³ Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente. Región de Murcia. Plaza Juan XXIII.
30071-Murcia. pedroj.solano@carm.es**RESUMEN:** Se designa un neotipo para el híbrido *Teucrium* × *salgadoi* Sennen [*T. capitatum* subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. × *T. carolipau* subsp. *fontqueri* (Sennen) Rivas Mart.]. Esta interpretación y tipificación hace necesaria la nueva combinación *Teucrium* × *salgadoi* nothosubsp. *riosii* (De la Torre & Alcaraz) Lahora, Cánovas & P. Solano. **Palabras clave:** *Lamiaceae*; *Teucrium*; híbrido; tipificación; España.**ABSTRACT:** Neotypification of *Teucrium* × *salgadoi* Sennen (*Lamiaceae*). A neotype is designated for the hybrid *Teucrium* × *salgadoi* Sennen [*T. capitatum* subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. × *T. carolipau* subsp. *fontqueri* (Sennen) Rivas Mart.]. Based on this interpretation and typification, the new combination *Teucrium* × *salgadoi* nothosubsp. *riosii* (De la Torre & Alcaraz) Lahora, Cánovas & P. Solano is proposed. **Keywords:** *Lamiaceae*; *Teucrium*; hybrid; typification; Spain.

INTRODUCCIÓN

El género *Teucrium* L. está especialmente diversificado en la Península Ibérica con más de 90 taxones aceptados, a los que hay que añadir casi medio centenar de híbridos descritos (NAVARRO, 1995, 2010).

El híbrido *Teucrium capitatum* L. subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. × *T. carolipau* C. Vicioso ex Pau subsp. *fontqueri* (Sennen) Rivas Mart. no resulta raro cuando conviven los dos parentales; sin embargo, hasta ahora no se le había asignado con certeza ningún nombre a esta combinación parental.

Ambos parentales pertenecen a la sect. *Polium* (Mill.) Schreb. Según *Flora iberica*, en *T. capitatum* [subsect. *Polium* (Mill.) M.E. Cohen] se reconocen tres subespecies y en *T. carolipau* [subsect. *Pumilum* Rivas Mart.] dos subespecies (NAVARRO, 2010).

Teucrium capitatum var. *gracillimum* Rouy fue válidamente publicado (ROUY, 1882) con una descripción en francés (sub var. *gracile*) y fue tipificado por NAVARRO & ROSÚA (1990). En este trabajo se acepta en el rango de subespecie (VALDÉS & SÁNCHEZ, 1978), aunque también se ha considerado como variedad *T. polium* var. *gracillimum* (Rouy) O. Bolòs & Vigo. Recientemente, con la interpretación como especie de *Teucrium valentinum* Schreb. (FERRER & al., 2015, 2024), se ha subordinado a este taxon como *T. valentinum* subsp. *gracillimum* (Rouy) P.P. Ferrer, R. Roselló, Gómez Nav. & Peris.

Teucrium fontqueri fue inicialmente publicado como especie por Sennen en los exsiccata *Plantes d'Espagne* 1924-1925 y tipificado por RIVAS MARTÍNEZ (1974), que lo combinó como subespecie: *Teucrium carolipau* subsp. *fontqueri* (Sennen) Rivas Mart., criterio que se acepta en este trabajo.

Otros híbridos entre taxones de las subsecciones *Polium* y *Pumilum* han sido anteriormente descritos (ALCARAZ & al., 1986; DE LA TORRE & ALCARAZ, 1992;

SOLANAS & al., 1993; CARRILLO & al., 1997; LAHORA & SÁNCHEZ GÓMEZ, 2010).

En este trabajo se neotipifica el nombre *Teucrium* × *salgadoi* Sennen (SENNEN, 1932), prioritario para los híbridos *T. capitatum* × *T. carolipau*; como consecuencia, se propone un ajuste nomenclatural para *Teucrium* × *riosii* De la Torre & Alcaraz [*T. capitatum* subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. × *T. carolipau* C. Vicioso ex Pau subsp. *carolipau*] (DE LA TORRE & ALCARAZ, 1992).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Teucrium* × *salgadoi Sennen nothosubsp. ***salgadoi*** in Buttl. Inst. Catalana Hist. Nat. 32(4): 102 (1932) [*Teucrium capitatum* L. subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. × *Teucrium carolipau* C. Vicioso ex Pau subsp. *fontqueri* (Sennen) Rivas Mart.]

Ind. loc.: "Entre Lorca te [sic] Carraclaca..."

Etimología: El epíteto notoespecífico de este híbrido probablemente esté dedicado a Vicente Alonso y Salgado (1845-1931), obispo de la diócesis de Cartagena de 1903 a 1931 y excelente botánico (CODORNÍU, 1918).

Neotypus (hic designatus): Hs, MURCIA: 30SXG7362, Cartagena, Subida a Roldán, 135 m, matorral, 3-VII-2025, P. Solano, J.L. Cánovas & P. Sánchez Gómez (MUB-SURESTE 116593).

Isonotypi: Hs, MURCIA: 30SXG7362, Cartagena, Subida a Roldán, 135 m, matorral, 3-VII-2025, P. Solano, J.L. Cánovas & P. Sánchez Gómez (MUB-SURESTE 116593; MA-01-00970099).

Otro material examinado: Hs, ALMERÍA, 30SWG9822, Vera, Fuente del Lobo, 110 m, tomillares sobre areniscas, 29-V-2021, A. Lahora (MUB-SURESTE 116598, 116599, 116600, 116601, 116602; MA-01-00970098). 30SWG8734, Zurgena, 240 m, tomillares, 2-VI-1997, A. Lahora (HUAL-08810; MUB-SURESTE 116597). MURCIA: 30SXG7363, Cartagena, Subida a Roldán, 125 m,

matorral, 3-VII-2025, P. Solano, J.L. Cánovas & P. Sánchez Gómez (MUB-SURESTE 116594).

SENNEN (1929: 1058) anunció, sin descripción ni diagnosis, la existencia del híbrido *T. × salgadoi*: "*Font. × capitatum* (*Salgadoi*)". Posteriormente, (SENNEN, 1932: 102) publicó una diagnosis breve, pero suficiente para validar el nombre, en una nota del n.º 7189: "Note 1.^a - Entre Lorca y Carraclaca nous avons trouvé une autre colonie de *T. Fontqueri* croissant avec le *T. angustifolium* Duf. *Inter parentes*, nous avons noté un hybride, *T. Salgadoi* Sennen, à faciès du premier, mais à capitules légèrement aggrégés de l'*angustifolium*". En una publicación posterior (SENNEN, 1936: 71) repite literalmente el mismo texto.

Para aclarar la identidad de *T. × salgadoi* se ha realizado una búsqueda de posible material original, tanto por el nombre como del n.º 7189 de las exsiccata, en numerosos herbarios digitales (A, B, BM, BR, C, G, GB, JE, K, L, LD, MAF, MANCH, MO, MPU, NY, OXF, P, PH, S, U, US, W, WAG) y plataformas web de colecciones científicas (CCH2, GBIF, JACQ, JSTOR, Naturalis, SVH), así como consultas directas a los conservadores de los herbarios ALME, BC y MA, que han confirmado que no se ha localizado material asociado a este nombre.

A continuación, se ha visitado la localidad típica mencionada por Sennen, entre Lorca y Carraclaca (Murcia), donde los únicos taxones del género que se han localizado son *T. capitatum* subsp. *gracillimum* y *T. carolipau* subsp. *fontqueri*, incluso conviviendo muy próximos; pero no se ha encontrado el híbrido. Esta zona ha sufrido profundas alteraciones desde la visita de Sennen.

En cuanto a los taxones parentales, SENNEN (1932, 1936) propone a *T. fontqueri* y "*T. angustifolium* Duf.". La planta atribuida a Dufour es en realidad *T. angustissimum* Schreb., endemismo del E y NE de España que no está presente en esta zona (DUFOUR, 1860: 431). Pero el anuncio SENNEN (1929: 1058) en el que indica que los parentales son *T. fontqueri* y *T. capitatum*, aunque no forma parte del protólogo, es fundamental para la interpretación del nombre *T. × salgadoi*.

Por otra parte, como ya se ha comentado, las dos únicas especies localizadas en la localidad típica son *T. capitatum* subsp. *gracillimum* y *T. carolipau* subsp. *fontqueri*, lo que apoya la interpretación de *T. × salgadoi* como híbrido entre ambos taxones.

Ante la ausencia de material tipo y para fijar la aplicación de este nombre, se designa aquí un neotipo recolectado en la franja litoral de Murcia, donde se presentan las poblaciones típicas de *T. carolipau* subsp. *fontqueri* (NAVARRO, 2010).

Se aporta también una descripción y una comparativa de los caracteres diferenciales (Tabla 1), así como fotografías del híbrido y los parentales (Figura 1).

Descripción: Sufrutice de hasta 30 cm, tallos erectos con pelos largos ondulados y pelos ramificados. Hojas (4)7-10 × 0,6-1 mm, lineares con margen revuelto, crenadas en el tercio superior, con fascículos axilares, verdes con pelos esparcidos y glándulas esferoidales. Inflorescencia ramificada, con (1)4-7 ramas laterales; ramificaciones con 1(3) cabezuelas 0,7 × 0,7-1 cm, ovoides o subesféricas, pedunculadas; brácteas similares a

las hojas, más cortas que la cabezuela floral; bracteolas 2,5 mm linear-lanceoladas más cortas que la flor, con pelos largos ondulados y glándulas esferoidales. Cáliz 2,5-4,5 mm campanulado con dientes agudos, cuspidados, no reticulado, con glándulas esferoidales y pelos ramificados largos y ondulados en el margen interno de los dientes. Corola 4,5-5 mm, blanca con lóbulos lateroposteriores glabros.

El aspecto general es intermedio entre el de ambos progenitores. Se diferencia de *T. capitatum* subsp. *gracillimum* por sus hojas verdes con escasos pelos y glándulas esferoidales; cáliz con glándulas esferoidales y corola mayor, de 4,5-5 mm con lóbulos lateroposteriores glabros. Se diferencia de *T. carolipau* subsp. *fontqueri* por sus hojas con escasos pelos; inflorescencia muy ramificada, cáliz más pequeño de 2,5-4,5 mm, no reticulado, con pelos largos y corola más pequeña.

Teucrium × salgadoi nothosubsp. *salgadoi* se ha localizado en las provincias de Murcia y de Almería (LAHORA, 2016) en tomillares del orden *Anthyllidetalia terniflorae* Rivas Goday & al., con *Cistus clusii* subsp. *multiflorus* Demoly, *Helianthemum almeriense* Pau, *Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers., *Helianthemum viscarium* Boiss. & Reut., *Sideritis ibanyezii* Pau, *Thymus hyemalis* Lange, etc.

Teucrium × salgadoi* nothosubsp. *riosii (De la Torre & Alcaraz) Lahora, Cánovas & P. Solano, **comb. et stat. nov.** [*T. capitatum* subsp. *gracillimum* (Rouy) Valdés Berm. × *T. carolipau* C. Vicioso ex Pau subsp. *carolipau*]

Teucrium × riosii De la Torre & Alcaraz in Acta Bot. Malac. 17: 136 (1992) [basónimo]

Ind. loc.: "Alicante: Solana del Fraile (Biar), 30S XH9375, ad 680 m alt."

Etimología: Dedicado a Segundo Ríos Ruiz, botánico.

Holotipus: MUB 21662; *isotypus*: ABH 1001.

DE LA TORRE & ALCARAZ (1992) ya discutieron la posibilidad de que *T. × salgadoi* Sennen fuera el híbrido *T. capitatum* subsp. *gracillimum* × *T. carolipau* subsp. *fontqueri*, sin embargo, no resolvieron las dudas sobre la identidad del nombre senneniano y describieron con un nombre nuevo el híbrido *T. × riosii* De la Torre & Alcaraz [*T. capitatum* subsp. *gracillimum* × *T. carolipau* subsp. *carolipau*]. Con la tipificación e interpretación de *T. × salgadoi* realizada en este trabajo, es necesaria esta nueva combinación.

Agradecimientos: A Pilar Funtetaja (ALME), Neus Ibáñez (BC) y Leopoldo Medina (MA) por las facilidades para la consulta de los herbarios. A Pedro Sánchez Gómez y Carlos Aedo por sus comentarios y sugerencias. A P. Pablo Ferrer Gallego, revisor del manuscrito, por sugerir el enfoque correcto del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCARAZ ARIZA, F., P. SÁNCHEZ GÓMEZ & J.S. CARRIÓN (1986). *Teucrium × estevei* Alcaraz, Sánchez-Gómez & Carrión hybr. nov. *Lazaroa* 9: 25-30.
- CARRILLO, A.F., A. HERNÁNDEZ, E. COY, J. GÜEMES & P. SÁNCHEZ GÓMEZ (1997). *Teucrium × carvalhoi* (Lamiaceae) nuevo híbrido para el sudeste Ibérico. *Acta Bot. Malac.* 22: 221-223.
- CODORNIÚ, R. (1918). *Más bagatelas forestales (1916 á 1918)*. Imprenta Alemana, Madrid.

- DE LA TORRE, A. & F. ALCARAZ ARIZA (1992). Híbridos nuevos en el género *Teucrium* L. (*Lamiaceae*). *Acta Bot. Malac.* 17: 135-143.
- DUFOUR, J.M.L. (1860). Diagnoses et observations critiques sur quelques plantes d'Espagne mal connues ou nouvelles. (suite). *Bull. Soc. Bot. France* 7: 426-433.
- FERRER GALLEGÓ, P.P., E. LAGUNA, R. ROSELLÓ, J. GÓMEZ, A. GUILLÉN & J.B. PERIS (2015). Sobre *Teucrium valentinum* Schreb. (Sect. *Polium*, *Labiatae*). *Flora Montiber.* 59: 59-68.
- FERRER GALLEGÓ, P.P., R. ROSELLÓ, J. GÓMEZ & J.B. PERIS (2024). *Teucrium* × *jaragueense*, nothosp. nov. (sect. *Polium*, *Labiatae*), nuevo híbrido para la flora valenciana. *Flora Montiber.* 88: 56-60.
- LAHORA, A. (2016). *Flora vascular y áreas clave para la biodiversidad vegetal del Levante Almeriense*. Almería, España. Tesis Doctoral. 676 pp. Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería, Almería.
- LAHORA, A. & P. SÁNCHEZ GÓMEZ (2010). *Teucrium* × *motae* nothosp. nov. para el SE Ibérico. *Acta Bot. Malac.* 35: 184-186.
- NAVARRO, T. (1995). Revisión del género *Teucrium* L. sección *Polium* (Mill.) Schreb., (*Lamiaceae*) en la Península Ibérica y Baleares. *Acta Bot. Malac.* 20: 173-265.
- NAVARRO, T. (2010). *Teucrium* L. in R. Morales, A. Quintanar, F. Cabezas, A.J. Pujadas & S. Cirujano (eds.). *Flora iberica* 12: 30-166. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- NAVARRO, T. & J.L. ROSÚA (1990). Nomenclatural and taxonomic notes on the *Teucrium* Sect. *Polium* (Miller) Schreber (*Lamiaceae*) in the Iberian Peninsula. *Candollea* 45(2): 581-589.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. (1974). Sobre el *Teucrium pumilum* L. (*Labiatae*) y sus especies afines. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 31(1): 79-96.
- ROUY, G. (1882). Matériaux pour servir à la révision de la flore portugaise accompagnés de Notes sur certaines espèces ou variétés critiques de plantes européennes. *Naturaliste* 4: 19-21, 30-31.
- SENNEN, F. (1929). A travers l'Espagne. *Bull. Soc. Bot. France* 76(5): 1049-1064.
- <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00378941.1929.10836331>
- SENNEN, F. (1932). Brèves diagnoses des formes nouvelles parues dans nos exiccata "Plantes d'Espagne -- F. Sennen". *Butl. Inst. Catalana Hist. Nat.* 32(4): 88-119.
- SENNEN, F. (1936). *Diagnoses des nouveautés parues dans les exsiccata Plantes d'Espagne et du Maroc de 1928 à 1935*. Imp. Anglada, Vic. <https://bibdigital.rjb.csic.es/duurl/1/9472>
- SOLANAS, J.L., M.B. CRESPO & A. de la TORRE (1993). Un nuevo nototaxon en el género *Teucrium* (*Lamiaceae*). *Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia* 19: 79-81.
- VALDÉS BERMEJO, E. & A. SÁNCHEZ CRESPO (1978). Datos cariológicos y taxonómicos sobre el género *Teucrium* L. (*Labiatae*) en la Península Ibérica. *Acta Bot. Malac.* 4: 27-54.




(Recibido el 25-VI-2026)
(Aceptado el 25-VII-2026)


Tabla 1. Principales caracteres diferenciales entre el híbrido y los parentales.

	<i>T. capitatum</i> subsp. <i>gracillimum</i>	<i>T. × salgadoi</i> nothosubsp. <i>salgadoi</i>	<i>T. carolipau</i> subsp. <i>fontqueri</i>
Indumento del tallo	pelos muy ramificados de ramas rectas o curvas	pelos largos ondulados y pelos ramificados	pelos largos ondulados y papilas
Hojas (mm)	4-7(10) × 1-1,5(2,5), densamente fasciculadas	(4)7-10 × 0,6-1, densamente fasciculadas	(4,5)10-12(13) × (0,5)1-1,5, fasciculadas hacia la base
Indumento de las hojas	viloso con pelos ramificados	con pelos esparcidos y glándulas esferoidales	glándulas esferoidales
Hojas, forma	lineares, crenadas desde el tercio basal	lineares, crenadas en el tercio superior	lineares, enteras u onduladas en el tercio superior
Inflorescencia	muy ramificada con (3)4(7) ramas laterales, ramificaciones con 3-5 cabezuelas esféricas	ramificada con (1)4-7 ramas laterales, ramificaciones con 1(3) cabezuelas ovoides o subesféricas	1-3 cabezuelas cortamente pedunculadas, subesféricas
Bractéolas	ovado-lanceoladas, más cortas que la flor, pubescentes	linear-lanceoladas, más cortas que la flor, con pelos largos ondulados y glándulas esferoidales	lanceolado-lineares, tan largas como la flor, glabras
Cáliz (mm)	2,7-3,5(4), tubular-campanulado	2,5-4,5, campanulado	4,5-5, tubular-campanulado
Indumento del cáliz	pubescente, con pelos ramificados largos y ondulados en el margen interno de los dientes	de glabrescente a pubescente, no reticulado, con glándulas esferoidales y pelos ramificados largos y ondulados en el margen interno de los dientes	glabrescente, reticulado, con glándulas esferoidales
Corola (mm)	3,5-4(4,5), blanca, rosada o púrpura	4,5-5, blanca	8-10, blanca o rosada
Lóbulos latero-posteriores de la corola	ciliados	glabros	glabros

**Figura 1.** Inflorescencias de **A:** *Teucrium capitatum* subsp. *gracillimum*, **B:** *T. × salgadoi* nothosubsp. *salgadoi* y **C:** *T. carolipau* subsp. *fontqueri*. Fotografías de J.L. Cánovas.

NOVEDADES EDITORIALES

 Las Gramíneas fáciles GUÍA VISUAL CON CLAVES PARA IDENTIFICAR LAS GRAMÍNEAS ÍBERO-BALEÁRICAS Carlos Romero Zarco	Las Gramíneas fáciles  Guía visual con claves para identificar las gramíneas íbero-baleáricas Carlos Romero Zarco <i>Monografías de Flora Ibérica, n° 28</i> Encuadernación rústica, A4, 370 páginas en color Ed. Jolube Fecha lanzamiento: mayo de 2026 ISBN: 979-13-991389-1-7 PVP: 45€ + envío
Catálogo florístico de la provincia de Guadalajara  Gonzalo Mateo Sanz, Óscar García Cardo, Julián García Muñoz <i>Monografías de Flora Montiberica, n° 10</i> Encuadernación rústica, 17 × 24 cm, 646 páginas en COLOR Fecha estimada de lanzamiento: noviembre de 2025 Ed. Jolube ISBN: 978-84-127863-7-8 PVP: 29,95€ + envío	 Catálogo florístico de la provincia de Guadalajara Gonzalo Mateo Sanz Óscar García Cardo Julián García Muñoz
 Catálogo florístico de la provincia de Cuenca Óscar García Cardo Gonzalo Mateo Sanz Juan Manuel Martínez Labarga	Catálogo florístico de la provincia de Cuenca  Óscar García Cardo, Gonzalo Mateo Sanz y Juan Manuel Martínez Labarga <i>Monografías de Flora Montiberica, n° 9</i> Encuadernación rústica, 17 × 24 cm, 770 páginas en color Ed. Jolube Fecha lanzamiento: diciembre de 2024 ISBN: 978-84-127863-2-3 PVP: 29,95€ + envío
Flora Valentina, V (Rosaceae - Zygophyllaceae)  Gonzalo Mateo Sanz, Manuel B. Crespo Villalba, Emilio Laguna Lumbreras Encuadernación tapa dura cosida, 22 x 27 cm, 260 páginas en COLOR Fecha de lanzamiento: enero de 2024 Ed. Jolube ISBN: 978-84-126656-1-1 PVP: 50€ + envío	 V FLORA VALENTINA ANGIOSPERMAL V: Rosaceae — Zygophyllaceae Gonzalo Mateo Sanz Manuel B. Crespo Villalba Emilio Laguna Lumbreras



Guía de campo de las ciperáceas de España y Portugal. 2ª ed.



Modesto Luceño Garcés y colaboradores

Monografías de Botánica Ibérica, n° 27

Encuadernación tapa dura 16,5 × 24 cm 598 páginas en **color**

Ed. Jolube

Fecha de lanzamiento: **abril de 2024**

ISBN: 978-84-126656-0-4

PVP: 60€ + envío

Versión en inglés disponible: **Field guide of Spanish and Portuguese sedges (Cyperaceae)**

Atlas de semillas de Aragón

Jorge Pueyo Bielsa, Alicia Cirujeda Ranzenberger, Gabriel Pardo


Edita: CITA-Gobierno de Aragón

Encuadernación rústica 24 × 20 cm. 117 pp en **color**.

Fecha lanzamiento: marzo de 2023

ISBN: 978-84-87944-60-4

PVP: 15€ + envío



Plantas tóxicas para rumiantes

H. Quintas, C. Aguiar, L. M. Ferrer, J.J. Ramos, D. Lacasta

Encuadernación rústica 19 × 24 cm

216 páginas en **COLOR**

Edita: Publicações Ciência e Vida e Instituto Agroalimentario de Aragón

Fecha lanzamiento: **diciembre de 2022**

ISBN: 972-590-103-8

PVP: 22,50€ + envío

Guía imprescindible de las flores de la Depresión del Ebro, 2ª edición corregida y aumentada

Javier Puente Cabeza

Col. Guías imprescindibles de flora, n° 5


Encuadernación rústica 16 × 21,6 cm. 390 páginas en **COLOR**


Ed. Jolube, 2024

Fecha lanzamiento: **enero de 2024**

ISBN: 978-84-947985-3-5

PVP: 24,95€ + envío





Malas hierbas en plántula. Guía de identificación. 2ª ed. revisada y ampliada

Jordi Recasens & Josep Antoni Conesa

Encuadernación rústica, 17,5 x 24,7 cm, 454 páginas en **COLOR**

Ed. Universitat de Lleida

Fecha lanzamiento: 2021

ISBN: 978-84-914432-4-7

PVP: 40€ + envío

Mis exploraciones botánicas en el Magreb. Retazos de un diario

Francisco Gómiz García


Edita: Jolube, 2024

Encuadernación rústica 17x 24 cm, 204 páginas en B/N

Fecha lanzamiento: **abril de 2024**

ISBN: 978-84-127863-0-9

PVP: 12,50€ + envío



Nueva revisión sintética de los géneros Hieracium y Pilosella en España

Gonzalo Mateo Sanz, Fermín del Egado Mazuelas & Francisco Gómiz García

Monografías de Botánica Ibérica, nº 25

Encuadernación rústica, 17 x 24 cm, 336 páginas en **color**

Ed. Jolube

Fecha lanzamiento: **marzo de 2022**

ISBN: 978-84-124463-8-8

PVP: 26,95€ + envío

Flora selecta marroquí

Francisco Gómiz García

Encuadernación tapa dura cosida, 15x21 cm. 351 pp.

Ed. Fco. Gómiz

Fecha lanzamiento: diciembre de 2001

ISBN: 978-84-932231-1-5

PVP: 39,95€ + envío

