

APORTACIONES Y NOVEDADES AL CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CUENCA, II

Óscar GARCÍA CARDO¹ & Gonzalo MATEO SANZ²

¹CIAF Albaladejito. Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF). Ctra. Cuenca-Toledo, km. 174. 16194-Cuenca. ogcardo@jccm.es [orcid.org/0000-0002-5515-9348]

²Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Quart, 80. 46008-Valencia. Gonzalo.mateo@uv.es

RESUMEN: Se comentan 25 táxones de plantas vasculares de interés detectadas en la provincia de Cuenca (España), de ellas 9 son novedades para este territorio. **Palabras clave:** flora; plantas vasculares; Castilla-La Mancha; Cuenca; España.

ABSTRACT: Contributions and novelties to the floristic catalogue of the province of Cuenca, II. Twenty-five vascular plant taxa of interest recorded in the province of Cuenca (Spain) are discussed, nine of them being new to the province. **Keywords:** flora; vascular plants; Cuenca; Castilla-La Mancha; Spain.

INTRODUCCIÓN

Hace ya un par de años que publicábamos el *catálogo florístico de la provincia de Cuenca* (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024). Desde entonces hemos seguido prospectando este territorio en busca de nuevos táxones o localidades de interés de especies ya identificadas. Este artículo corresponde a la segunda entrega de esta última serie de aportaciones a dicho catálogo (GARCÍA CARDO & MATEO, 2025), la cual tiene como objetivo ir completándolo y enmendándolo.

De forma paralela a esta serie, en el caso del descubrimiento de especies con alta singularidad y rareza, se publican notas independientes a esta serie, tal y como recientemente se ha hecho con las especies *Verbascum hervieri* (GARCÍA CARDO & GARCÍA CARDO, 2026) y *Melica amethystina* (GARCÍA CARDO, 2026).

El sistema de coordenadas empleado en las citas es UTM-ETRS89, y las referencias a los autores se abrevian como *ÓGC* y *GMS* respectivamente.

LISTADO DE PLANTAS

Amsinckia calycina (Moris) Chater

***CUENCA:** 30TWK2248, Fuentenava de Jábaga, pinar de los Llanos, 900 m, ambientes arvenses y ruderales bajo aillantos, 20-V-2025, *ÓGC* (ÓGC-6488; IRIAF-7571).

Especie novedosa para la provincia de Cuenca, exótica, originaria de Sudamérica, naturalizada en Australia, Francia y España (JUAN, 2012), en este último caso con presencia confirmada en las provincias de Madrid, Ávila, Zamora, Toledo, Salamanca y Granada (JUAN, 2012; GBIF, 2026), con una población descolgada por el norte de Burgos (PATINO & VALENCIA, 2000).

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

CUENCA: 30TWK2248, Huete, los Berrocales, 790 m, bloques rocosos de sílex, 12-VIII-2025, *ÓGC* & *N. Cardo Maeso* (ÓGC-6451; IRIAF-7534).

Hierba bienal, de porte elevado y con clara preferencia por sustratos silíceos, lo que hace que sea una especie poco común en la provincia de Cuenca, y más aún en La Alcarria (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), donde dominan los sustratos yesíferos, margosos y arcillosos. La población aportada se asienta en grietas y repisas de enormes bloques de

sílex, que conforman un singular paisaje denominado “El Berrocal”, donde se acompaña de otras especies interesantes para esta comarca como *Sedum andegavense*.

Asphodelus fistulosus L.

CUENCA: 30TWK7439, Cuenca, pr. polígono industrial Cuberg, 940 m, comunidades ruderales en cunetas de carretera, 10-IV-2026, *ÓGC* (IRIAF-s/n).

Pequeño gamón que poco a poco va ganando terreno por las zonas bajas y medias de la provincia (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), siendo posible que dicha expansión pueda estar favorecida por la aplicación de herbicidas en cunetas de vías de comunicación. La localidad aquí aportada es la que más se adentra en territorios serranos, siendo por tanto la ubicada a mayor altitud.

Baldellia repens (Lam.) Lawalrée subsp. **cavanillesii** (Molina Abril, A. Galán, J.M. Pizarro & Sard. Rosc.) Talavera

CUENCA: 30TWK2248, Puebla de Don Francisco, el Prado, 780 m, comunidades anfibias temporales oligomesotróficas en cultivos y entre cerros yesíferos, 12-VIII-2025, *ÓGC* & *N. Cardo Maeso* (ÓGC-7200; IRIAF-8334).

Hierba perenne propia de comunidades anfibias temporales. Su distribución atlántica hace que en esta provincia tenga carácter finícola y por tanto sea muy escasa, donde se conoce previamente tan solo de Monteagudo de las Salinas (GARCÍA CARDO & SÁNCHEZ MELGAR, 2022) y Cañada del Hoyo (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024).

Bidens frondosa L.

CUENCA: 30SWJ7384, Olmedilla de Alarcón, embalse de Alarcón, pr. cerro del Pino, 805 m, suelos arenosos subnitrófilos con humedad temporal, 31-X-2025, *ÓGC* (ÓGC-6777; IRIAF-7897).

Hierba anual, exótica, al parecer originaria del este de Norteamérica (CRESPO, 2019), que está ampliamente naturalizada en las regiones de clima suave de Europa, este de Asia y Nueva Zelanda. En la provincia de Cuenca la detectamos por primera vez en la Laguna de Talayuelas (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024); sin embargo, parece estar ya bien extendida por los grandes embalses de Cuenca y Guadalajara.

***Bidens tripartita* L.**

CUENCA: 30TWK2665, Villalba del Rey, los Pelotares, pr. embalse de Buendía, 690 m, comunidades anfibias estacionales en borde de embalse, 30-VIII-2025, *ÓGC* (ÓGC-6914; IRIAF-8048).

Hierba anual, originaria de Europa, Asia, norte de África (Argelia) y Norteamérica (CRESPO, 2019). Vive en suelos húmedos o encharcados temporalmente bastante nitrificados, siendo las orillas de los embalses uno de sus hábitats típicos. En la provincia únicamente la conocíamos previamente del embalse de Alarcón, concretamente de Olmedilla de Alarcón (MATEO & MORENO, 2003).

***Cephalaria syriaca* (L.) Roem. & Schult.**

CUENCA: 30SWJ9599, Almodóvar del Pinar, Vallejo de la Ermita, 1030 m, cultivo de cereal parcialmente encharcado, 22-V-2024, *ÓGC* (ÓGC-4950; IRIAF-4635). 30TWK7136, Cuenca, Cerro de las Cañadillas, 930 m, comunidades arvenses y ruderales, 7-VII-2025, *ÓGC* & *I. Sánchez Melgar* (v.v.).

Hierba anual que se distribuye por el entorno del mediterráneo y el suroeste de Asia (DEVESA, 2007a), y que en Cuenca solo se conoce de las comarcas de La Alcarria y la Mancha Alta, con alguna población más en el extremo oriental (ATERIDO, 1899; GARCÍA ABAD, 2018; GARCÍA CARDO & *al.*, 2024). Habita en ambientes agrícolas exentos de aplicación de herbicidas, por lo que cada vez es más difícil de observar.

***Crypsis alopecuroides* (Piller & Mitterp.) Schrad.**

CUENCA: 30TWK2662, Villalba del Rey, embalse de Buendía, 690 m, comunidades anfibias estacionales en borde de embalse, 30-VIII-2025, *ÓGC* (ÓGC-6916; IRIAF-8050).

Gramínea anual, diferenciable de sus congéneres por sus espigas largamente oblongas bien separadas de las vainas de las hojas superiores en la madurez. Se asocia a comunidades anfibias temporales oligomesotróficas con cierto grado de alteración. En la provincia de Cuenca solo la conocíamos previamente del embalse de Buendía por Torrubia del Castillo (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024).

***Epilobium brachycarpum* C. Presl**

CUENCA: 30TWK8135, Palomera, pr. río Huécar hacia el sendero de Molinos de Papel, 1045 m, comunidades arvenses y ruderales, 12-X-2025, *ÓGC* & *Ó. García Sánchez* (ÓGC-6787; IRIAF-7921).

Hierba exótica y con tendencia invasora, originaria de Norteamérica y Argentina (NIETO, 1997). Descubierta recientemente en la provincia de Cuenca (GARCÍA CARDO, 2018), donde parece encontrarse en proceso de expansión por cunetas, bordes de caminos y otros medios alterados nitrificados.

***Galium rotundifolium* L.**

CUENCA: 30TWK8969, Cuenca, umbría de la Peña del Reloj, 1200 m, pastizales terofíticos y vivaces silicícolas en pinar albar, 15-VII-2025, *ÓGC* & *N. Cardo Maeso, F. Alonso Gutiérrez & F. García Porras* (ÓGC-6980; IRIAF-8114).

Hierba perenne, caracterizada por sus hojas anchas ovado-orbiculares y verticiladas por cuatro. Es muy escasa en la provincia, donde se extralimita poco de los afloramientos

triásicos más húmedos de este territorio -Sierra de Valdemeca y Brezal de Masegosa- (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), por lo que cualquier referencia fuera de este ámbito merece la pena ser destacada.

***Juniperus* × *herragudensis* Aparicio & Uribe-Echeb. (Fig. 1)**

***CUENCA:** 30TWK8448, Cuenca, pr. Cueva de los Morciguillos, 1370 m, pie de roquedo calizo en pinar de pino laricio, 25-XII-2025, *ÓGC* & *C. García Sánchez* (IRIAF-s/n).

Taxón tipificado de la provincia de Castellón, resultante de la hibridación de *J. phoenicea* L. subsp. *phoenicea* con *J. sabina* L. (APARICIO & URIBE-ECHEBARRÍA, 2008). Hasta la fecha no se había detectado este híbrido en la provincia de Cuenca, donde los dos parentales muy raramente contactan en la actualidad; de hecho, en la localidad aportada falta uno de ellos (*J. sabina*).

***Lathyrus nissolia* L.**

CUENCA: 30TWK9367, Cuenca, el Hosquillo, 1220 m, pastizales silicícolas en umbría bajo pino albar y negro, 5-VI-2025, *ÓGC* (ÓGC-6418; IRIAF-7501).

Grácil y tenue leguminosa euroasiática y norteafricana, muy escasa en el contexto del Sistema Ibérico meridional, y más concretamente en la provincia de Cuenca, donde tan solo se conoce de unas pocas localidades serranas (MATEO & HERNÁNDEZ, 1998; GARCÍA CARDO & SÁNCHEZ, 2008; GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), siempre en suelos arenosos silíceos en estaciones con altas precipitaciones.

***Oenothera biennis* L. (Fig. 2)**

***CUENCA:** 30TWK6589, Carrascosa de la Sierra, Herrería de Santa Cristina, 880 m, cultivada como ornamental, 02-IX-2009, *ÓGC* (v.v.). 30TWK7753, Villalba de la Sierra, entorno a la carretera de Cuenca a Tragacete, 970 m, comunidades arvenses y ruderales, escapada de cultivo como ornamental, 02-VII-2021, *ÓGC* (v.v.).

Hierba exótica invasora, originaria de Norteamérica (DIETRICH, 1997), que ha sido empleada en jardinería por su vistosa floración. No indicada en el catálogo florístico provincial (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024); sin embargo, sí que ha sido observada en las dos localidades citadas. De hecho, en Villalba de la Sierra fue eliminada por la Administración al detectarse su capacidad expansiva invasora a lo largo de las cunetas de la carretera.

***Oenothera rosea* L'Hér.**

***CUENCA:** 30TWK7237, Cuenca, pr. Universidad, 940 m, comunidades ruderales, 12-VIII-2017, *ÓGC* (ÓGC-2558; IRIAF-2227).

Hierba anual o perennizante, originaria del continente americano (DIETRICH, 1997), que parece naturalizarse con facilidad en zonas de clima suave de la Península Ibérica. Al igual que la especie anterior, tampoco se citó en el catálogo provincial (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024); sin embargo, contamos con una recolección en el núcleo urbano de la ciudad de Cuenca.

***Opopanax chironium* (L.) W.D.J. Koch**

CUENCA: 30TWK6564, Sotorribas (Ribagorda), pr. Collado de San Acacio, 1000 m, talud entre cultivos, 15-

VI-2024, *Ó.G.C., J.M. García Cardo & R. García Cardo* (ÓGC-5025; IRIAF-4710).

Umbelífera llamativa por su gran tamaño, que se distribuye por la región mediterránea europea, y en la Península Ibérica se extiende por el noreste, centro y sur, y está presente también en las Islas Baleares (VILLAR, 2003). En la provincia de Cuenca se limita a la comarca de La Alcarria y la Mancha Alta (ARÁN & MATEO, 1999; GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), siendo novedosa por tanto en territorios serranos, donde debe ser muy rara, aunque tal vez en expansión.

Orobanché clausonis Pomel

CUENCA: 30SXJ1099, Paracuellos, pr. Cerro de los Huesos, 820 m, sobre *Rubia peregrina*, 16-VI-2026, *com. pers. A. Jorge San Vicente* (v.v.).

Jopo termófilo y circunmediterráneo parásito específico de *Rubia peregrina*, que en la Península Ibérica se limita en gran medida a su área meridional, y que en la provincia de Cuenca tan solo se conoce de una localidad en El Picazo (MATEO & *al.*, 2020). La población aportada se ajusta a los requerimientos ecológicos citados, pudiendo tratarse de una especie en expansión en la actualidad.

Phacelia tanacetifolia Benth.

***CUENCA:** 30TWK8752, Uña, el Verdinal, 1110 m, comunidades arvenses en ambiente hortícola, 30-VI-2026, *ÓGC* (IRIAF-s/n).

Hierba anual, hispida, con inflorescencias en cimas escorpioides, flores de corola azulada y hojas pinnatisectas -de ahí su nombre-. Es originaria del oeste de Norteamérica y ha sido cultivada como planta melífera (SILVESTRE & QUINTANAR, 2012), lo que ha favorecido su naturalización. No la conocíamos de la provincia de Cuenca (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), siendo sorprendente su aparición de forma espontánea en ambientes hortícolas serranos, posiblemente escapada de alguna plantación.

Pilosella aurantiaca (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. (Fig. 3)

***CUENCA:** 30TWK7237, Cuenca, rotonda del Alcampo, 940 m, rotonda con césped artificial, 10-IX-2024, *ÓGC* (ÓGC-5173; IRIAF-4859).

Hierba perenne, montana, originaria de centro, norte y este de Europa, pero que parece bien extendida y naturalizada por casi todas las regiones del hemisferio norte (GBIF, 2026). Se cultiva como ornamental (MATEO & *al.*, 2017) por su llamativa y vistosa floración; aún así, existen muy pocas referencias de ella en España (GBIF, 2026). La población conquense aparece aparentemente naturalizada en una rotonda en la que en muy pocas ocasiones puede verse en flor, pues suelen pasar el cortacésped con cierta frecuencia.

Rumex palustris Sm.

***CUENCA:** 30SWJ7384, Olmedilla de Alarcón, embalse de Alarcón, pr. cerro del Pino, 805 m, suelos arenosos subnitrófilos con humedad temporal, 31-X-2025, *ÓGC* (ÓGC-6768; IRIAF-7860).

Hierba europea, anual o bienal, bien caracterizada por sus piezas externas del perianto fructífero, que son estrechamente triangulares, con ápice lingüiforme y con 2-4 dientes de hasta 2 mm a cada lado. Es propia de canales de

riego, graveras o terrenos inundados (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1990), poco frecuente en España (GBIF, 2026), donde se extiende por el centro, sur y oeste, siendo novedosa para la provincia de Cuenca.

Salvia hispanica L. (Fig. 4)

***CUENCA:** 30SWJ7384, Olmedilla de Alarcón, embalse de Alarcón, pr. cerro del Pino, 805 m, suelos arenosos subnitrófilos con humedad temporal, 31-X-2025, *ÓGC* (ÓGC-6780; IRIAF-7900).

La salvia española, o mejor conocida popularmente como chía, es una labiada muy apreciada por sus semillas ricas en ácido graso omega 3. Curiosamente, contrariando su nombre vulgar, es originaria de Centroamérica, y el consumo de sus semillas se ha popularizado en los países del “Viejo Mundo” como un superalimento. Esta situación ha favorecido su expansión, siempre buscando zonas húmedas de climas suaves; de hecho, en España parece limitarse a las zonas costeras y algunas áreas de los valles de los principales ríos peninsulares de baja altitud (GBIF, 2026). Su aparición en la provincia de Cuenca es novedosa, así como su descubrimiento, pues fue detectada de tal forma que las plantas aparecían siguiendo una línea de desecación concreta del embalse de Alarcón, donde lógicamente se habían depositado las semillas procedentes de su previo consumo humano en los pueblos aguas arriba de dicha infraestructura fluvial.

Saxifraga cuneata Willd.

CUENCA: 30SXX2328, Campillos-Paravientos, Alto del Pico hacia el río Cabriel, 1120 m, roquedos calizos jurásicos, 17-VIII-2025, *ÓGC & J.M. García Cardo* (ÓGC-7056; IRIAF-8190). 30TXK0033, La Cierva, Rambla Seca, 1100 m, roquedos calizos jurásicos, 15-XII-2024, *ÓGC* (v.v.).

Planta perenne y estrictamente rupícola, aunque indiferente edáfica, endémica del mediterráneo noroccidental (MATEO & TORRES, 1999). En la provincia de Cuenca es una planta más bien escasa, y se limita a su cuadrante nororiental, desde las zonas altas de Zafrilla hasta las Sierras de Mira y Talayuelas (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1976; MATEO, 1983; MAYORAL, 2011; GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), por lo que cualquier nueva localización tiene un interés relevante.

Scabiosa galianoi Devesa, Ortega Oliv. & J. López

CUENCA: 30SWK2517, Huete (Villas Viejas), los Espejares, 830 m, comunidades gipsícolas, 1-VII-2025, *Ó.G.C., S. Prieto & A. Orozco* (ÓGC-6984; IRIAF-8118).

Hierba anual endémica de la mitad meridional de la Península Ibérica (DEVESA, 2007b), que alcanza la provincia de Cuenca de forma testimonial, con referencias concretas previas en ambientes yesíferos de Zarza de Tajo, Huete y Belinchón (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024).

Sedum andegavense (DC.) Desv.

CUENCA: 30TWK2248, Huete, los Berrocales, 790 m, bloques rocosos de sílex, 12-VIII-2025, *ÓGC & N. Cardo Maeso* (v.v.).

Diminuto terófito crasicaule, propio de repisas y roquedos silíceos térmicos, que se distribuye por la región mediterránea occidental y el suroeste de Europa (CASTROVIEJO &

VELAYOS, 1997). En la provincia de Cuenca se conoce exclusivamente de su cuadrante nororiental serrano (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1976; PINILLOS, 2000; MAYORAL, 2011; SAIZ GALLEGU, 2013; GARCÍA CARDO & GARCÍA CARDO, 2019; GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), por lo que la cita alcarreña aquí aportada contribuye a ampliar notablemente su área de distribución en este territorio.

Tragopogon lamottei Rouy

CUENCA: 30SXK2529, Campillos-Paravientos, pr. Peña de los Canales, 1100 m, fenales riparios, 12-VII-2025, *ÓGC* (ÓGC-06199; IRIAF-7260).

Hierba bienal o perenne, que se extiende por el centro y sur de Europa, que en la Península Ibérica se ciñe a su mitad septentrional (DÍAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 2017). En la provincia de Cuenca es muy escaso, y se restringe a unas pocas poblaciones en su área más serrana, desde Talayuelas al Alto Tajo (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024), por lo que cualquier nueva aportación es muy valiosa.

Vicia articulata Hornem.

***CUENCA:** 30TWK6736, Huete, los Berrocales, 900 m, comunidades arvenses y ruderales, 08-IV-2026, *ÓGC* (ÓGC-s/n; IRIAF-s/n).

Alverja anual y trepadora originaria del sur de Europa, suroeste de Asia y Egipto (ROMERO ZARCO, 1999). Su empleo en agricultura como planta forrajera ha contribuido a su expansión por gran parte de la Península Ibérica. Se trata de una especie novedosa para la provincia de Cuenca, no indicada en el catálogo provincial (GARCÍA CARDO & *al.*, 2024).

BIBLIOGRAFÍA

- APARICIO, J.M. & P.M. URRIBE-ECHEBARRÍA (2008). Juniperus × herragudensis, otro nuevo híbrido de la provincia de Castellón. *Mainhardt* 60: 83-85.
- ARÁN REDÓ, V.J. & G. MATEO (1999). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, X. *Fl. Montib.* 12: 33-39.
- ATERIDO, L. (1899) Lista ordenada metódicamente de muchas plantas de la provincia de Cuenca. *Actas Soc. Esp. Hist. Nat.* 28: 195-202.
- CASTROVIEJO, S. & M. VELAYOS (1997). *Sedum* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 5: 121-153. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- CRESPO, M.B. (2019). *Bidens* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 16(3): 2114-2132. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- DEVESA, J.A. (2007a). *Cephalaria* Schrad. ex Roem. & Schult. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 15: 276-286. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- DEVESA, J.A. (2007b). *Scabiosa* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 15: 320-336. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- DÍAZ DE LA GUARDIA, C. & G. BLANCA (2017). *Tragopogon* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 16(2): 795-812. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- DIETRICH, W. (1997). *Oenothera* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 8: 90-100. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- GARCÍA ABAD ALONSO, J.J. (2018). *Distribución geográfica provisional de cinco xenófitos arvenses en las unidades neógenas orientales de la depresión del Tajo. Bosque mediterráneo y humedales: Paisaje, evolución y conservación*. X Congreso Español de Biogeografía (XCEB018) Tomo 2: 622-634.
- GARCÍA CARDO, Ó. (2018). Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca, VI. *Fl. Montib.* 71: 9-17.
- GARCÍA CARDO, Ó. (2026). *Verbascum hervieri* Degen, otro valioso endemismo bético descubierto en el Sistema Ibérico meridional. *Fl. Montib.* 94: 54-57.
- GARCÍA CARDO, Ó. (2026). Sobre la presencia de *Melica amethystina* Pourr. en España y su reciente descubrimiento en la Serranía de Cuenca. *Fl. Montib.* 95: 3-6.
- GARCÍA CARDO, Ó. & J.M. GARCÍA CARDO (2019) Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca, VII. *Fl. Montib.* 74: 128-131.
- GARCÍA CARDO, Ó., G. MATEO & J.M. MARTÍNEZ LABARGA (2024). *Catálogo florístico de la provincia de Cuenca*. Monografías de Flora Montibérica 9. Jolube Consultor Botánico y Editor.
- GARCÍA CARDO, Ó. & G. MATEO (2025). Aportaciones y novedades al catálogo florístico de la provincia de Cuenca, I. *Fl. Montib.* 93: 42-48.
- GARCÍA CARDO, Ó. & I. SÁNCHEZ MELGAR (2022). Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca, IX. *Fl. Montib.* 84: 3-7.
- GARCÍA CARDO, Ó. & I. SÁNCHEZ MELGAR (2008). Aportaciones a la flora del Sistema Ibérico meridional, II. *Fl. Montib.* 40: 13-24.
- GBIF (2026). The Global Biodiversity Information. Facility. Consultado en septiembre de 2026 en <http://www.gbif.org>.
- JUAN, R. (2012). *Amsinckia* Lehm. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 11: 486-489. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1976) *Contribución al estudio florístico y fitosociológico de la Serranía de Cuenca*. Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral inédita, 528 pp.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1990). *Rumex* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 2: 595-634. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- MATEO SANZ, G. (1983) *Estudio sobre la Flora y Vegetación de las Sierras de Mira y Talayuelas*. Monografías nº 31 ICONA, 290 pp.
- MATEO SANZ, G., Ó. GARCÍA CARDO & J.M. MARTÍNEZ LABARGA (2020). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XXXIII. *Fl. Montib.* 78: 104-111.
- MATEO SANZ, G. & M.L. HERNÁNDEZ VIADEL (1998). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, VII. *Fl. Montib.* 10: 49-53.
- MATEO SANZ, G. & J.M. MORENO VALDEOLIVAS (2003). Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XIX. *Fl. Montib.* 23: 25-28.
- MATEO SANZ, G., S. TALAVERA & F. DEL EGIDO (2017). *Pilosella* Vaill. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 16(2): 1261-1294. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- MATEO SANZ, G. & S. TORRES SANCHÍS (1999). El género *Saxifraga* L. en el Sistema Ibérico. *Fl. Montib.* 12: 5-21.
- MAYORAL GARCÍA-BERLANGA, O. (2011) *Estudio florístico y aportaciones a la conservación del alto Cabriel (Cuenca)*. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia, 534 pp.
- NIETO FELINER, G. (1997). *Epilobium* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 8: 101-131. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.
- PATINO, S. & J. VALENCIA (2000). Notas corológicas sobre la flora vascular del País Vasco y alrededores (IX). *Estud. Mus. Cien. Nat. Álava* 15: 221-238.
- PINILLOS LÓPEZ, J.A. (2000) *Estudio de la vegetación y la flora del campo de Garcimuñoz: baja y media Serranía (Cuenca)*. Universidad de Valencia, 245 pp.
- ROMERO ZARCO, C. (1999). *Vicia* L. in S. Castroviejo & *al.* (eds.). *Flora iberica* 7(1): 360-417. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

SAIZ GALLEGO, B. (2013) *Aproximación al Catálogo Florístico de Sotos*. E.U.I.T. Forestal. Madrid. Proyecto Fin de Carrera inéd., 105 pp.

SILVESTRE, S. & A. QUINTANAR (2012). *Phacelia* Juss. in S. Castroviejo & al. (eds.). *Flora iberica* 11: 319-321. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

VILLAR, L. (2003). *Opopanax* W.D.J. Kochin S. Castroviejo & al. (eds.). *Flora iberica* 10: 343-345. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

(Recibido el 24-IX-2026)

(Aceptado el 28-IX-2026)



Fig. 1. *Juniperus* × *herragudensis* de Cuenca.



Fig. 2. *Pilosella aurantiaca* de Cuenca.







Fig. 3. *Oenothera biennis* de Cuenca.



Fig. 4. *Salvia hispanica* de Olmedilla de Alarcón (Cuenca).

NOVEDADES EDITORIALES

 Las Gramíneas fáciles GUÍA VISUAL CON CLAVES PARA IDENTIFICAR LAS GRAMÍNEAS ÍBERO-BALEÁRICAS Carlos Romero Zarco	Las Gramíneas fáciles  Guía visual con claves para identificar las gramíneas íbero-baleáricas Carlos Romero Zarco <i>Monografías de Flora Ibérica, n° 28</i> Encuadernación rústica, A4, 370 páginas en color Ed. Jolube Fecha lanzamiento: mayo de 2026 ISBN: 979-13-991389-1-7 PVP: 45€ + envío
Catálogo florístico de la provincia de Guadalajara  Gonzalo Mateo Sanz, Óscar García Cardo, Julián García Muñoz <i>Monografías de Flora Montiberica, n° 10</i> Encuadernación rústica, 17 × 24 cm, 646 páginas en COLOR Fecha estimada de lanzamiento: noviembre de 2025 Ed. Jolube ISBN: 978-84-127863-7-8 PVP: 29,95€ + envío	 Catálogo florístico de la provincia de Guadalajara Gonzalo Mateo Sanz Óscar García Cardo Julián García Muñoz
 Catálogo florístico de la provincia de Cuenca Óscar García Cardo Gonzalo Mateo Sanz Juan Manuel Martínez Labarga	Catálogo florístico de la provincia de Cuenca  Óscar García Cardo, Gonzalo Mateo Sanz y Juan Manuel Martínez Labarga <i>Monografías de Flora Montiberica, n° 9</i> Encuadernación rústica, 17 × 24 cm, 770 páginas en color Ed. Jolube Fecha lanzamiento: diciembre de 2024 ISBN: 978-84-127863-2-3 PVP: 29,95€ + envío
Flora Valentina, V (Rosaceae - Zygophyllaceae)  Gonzalo Mateo Sanz, Manuel B. Crespo Villalba, Emilio Laguna Lumbreras Encuadernación tapa dura cosida, 22 x 27 cm, 260 páginas en COLOR Fecha de lanzamiento: enero de 2024 Ed. Jolube ISBN: 978-84-126656-1-1 PVP: 50€ + envío	 V FLORA VALENTINA ANGIOSPERMAL (V). Rosaceae — Zygophyllaceae Gonzalo Mateo Sanz Manuel B. Crespo Villalba Emilio Laguna Lumbreras



Guía de campo de las ciperáceas de España y Portugal. 2ª ed.



Modesto Luceño Garcés y colaboradores

Monografías de Botánica Ibérica, nº 27

Encuadernación tapa dura 16,5× 24 cm 598 páginas en **color**

Ed. Jolube

Fecha de lanzamiento: **abril de 2024**

ISBN: 978-84-126656-0-4

PVP: 60€ + envío

Versión en inglés disponible: Field guide of Spanish and Portuguese sedges (Cyperaceae)

Atlas de semillas de Aragón



Jorge Pueyo Bielsa, Alicia Cirujeda Ranzenberger, Gabriel Pardo


Edita: CITA-Gobierno de Aragón

Encuadernación rústica 24 × 20 cm. 117 pp en **color**.

Fecha lanzamiento: marzo de 2023

ISBN: 978-84-87944-60-4

PVP: 15€ + envío



Plantas tóxicas para rumiantes



H. Quintas, C. Aguiar, L. M. Ferrer, J.J. Ramos, D. Lacasta

Encuadernación rústica 19 × 24 cm

216 páginas en **COLOR**

Edita: Publicações Ciência e Vida e Instituto Agroalimentario de Aragón

Fecha lanzamiento: **diciembre de 2022**

ISBN: 972-590-103-8

PVP: 22,50€ + envío

Guía imprescindible de las flores de la Depresión del Ebro, 2ª edición corregida y aumentada



Javier Puente Cabeza

Col. Guías imprescindibles de flora, nº 5


Encuadernación rústica 16 × 21,6 cm. 390 páginas en **COLOR**


Ed. Jolube, 2024

Fecha lanzamiento: **enero de 2024**

ISBN: 978-84-947985-3-5

PVP: 24,95€ + envío





Malas hierbas en plántula. Guía de identificación. 2ª ed. revisada y ampliada

Jordi Recasens & Josep Antoni Conesa

Encuadernación rústica, 17,5 x 24,7 cm, 454 páginas en **COLOR**

Ed. Universitat de Lleida

Fecha lanzamiento: 2021

ISBN: 978-84-914432-4-7

PVP: 40€ + envío

Mis exploraciones botánicas en el Magreb. Retazos de un diario

Francisco Gómiz García


Edita: Jolube, 2024

Encuadernación rústica 17x 24 cm, 204 páginas en B/N

Fecha lanzamiento: **abril de 2024**

ISBN: 978-84-127863-0-9

PVP: 12,50€ + envío



Nueva revisión sintética de los géneros Hieracium y Pilosella en España

Gonzalo Mateo Sanz, Fermín del Egado Mazuelas & Francisco Gómiz García

Monografías de Botánica Ibérica, nº 25

Encuadernación rústica, 17 x 24 cm, 336 páginas en **color**

Ed. Jolube

Fecha lanzamiento: **marzo de 2022**

ISBN: 978-84-124463-8-8

PVP: 26,95€ + envío

Flora selecta marroquí

Francisco Gómiz García

Encuadernación tapa dura cosida, 15x21 cm. 351 pp.

Ed. Fco. Gómiz

Fecha lanzamiento: diciembre de 2001

ISBN: 978-84-932231-1-5

PVP: 39,95€ + envío

